

Symbolæ ad Mycologiam fennicam.

Auctore

P. A. KARSTEN.

III.

X.

Peziza Syrjensis n. sp. — Apothecia sessilia, urceolata, margine integerrimo, laevia, subfurfuracea, flava, fundo in olivaceum vergente, altit. et latit. 1 em. — Supra terram arenosam specimina tria insimul in Syrjöäs mense ineunte Septembri hujus anni (1874) legimus, sed perdidimus, qvare definitionem plenioriem dare non possumus.

Peziza Thümenii Karst. in Thüm. Myceth. univers. — Apothecia subieulo tomentoso, denso, albido insidentia, dense gregaria, sœpe confluentia, primitus obconoidea, demum explanata, in stipitem brevissimum crassum attenuata, epithecio plano-coneavo, margine tenui, membranaceo, crenulato, extus subgranulosa, primo tota pallida, mox flava vel citrina, deorsum pallescentia, latit. 1—3 mm. Ascii cylindracei, jodo haud tinti, longit. 140 mmm. (pars sporif.). crassit. 12—14 mmm. Sporae 8:næ, monostichæ, ellipsoideæ vel oblongatæ, uniguttulatæ, hyalinæ, longit. 22—24 mmm., crassit. 8—10 mmm. Paraphyses filiformes, apice leviter curvulæ et incrassatæ. — Supra muscos, acus aliaque corpora in silva Syrjöäs, unico loco umbroso, mensi Septembri abundanter obvia. — Species admodum insignis, subicolo effuso, tomentoso, denso varia corpora Tapesiarum more obtegente. *Pezizam omphalodem* in memoriam revocat.

Rutstroemia gracilipes n. sp. — Apothecia sparsa, stipitata, glabra. Cupula concava, sicca convexa, alutacea vel rufescens, latit. circiter 3 mm. Stipes deorsum attenuatus, subflexuosus, pallidior, gracillimus, maxima parte terrae immersus, altit. circiter 1 em. Ascii cylindracei, apice jodo dilute cærulescentes, longit. circiter 120 mmm. (pars sporif.), crassit. 11—12 mmm. Sporæ 8:næ, monostichæ, ellipsoideæ vel sphæroideo-ellipsoideæ, guttulis duabus, apicalibus, exiguis præditæ, hyalinæ, longit. 14—20 mmm., crassit. 9—11 mmm. Paraphyses filiformes, graciles. — In terra humosa prope Mustiala specimina perpauea d. 21 mensis Septembris legimus. — Cum *R. homocarpa* et *R. macilenta* comparanda, sed ab utraque sporis majoribns, colore alutaceo etc. mox distincta.

Melotium Persoonii (Moug.) Karst. *Stannaria Persoonii* Fuck. Symb. myc. p. 309, ad Mustiala in Eqviseto arvensi mense Junii 1871 et 1872 et in sepulereto parœciae Tammela in Eqv. hiemali mensibus Augusto—Octobri 1873 et 1874 copiose a nobis lectum. — Sporæ oblongatae, longit. 14—19 mmm., crassit. 6—7 mmm.

Lophiostoma præmorsum (Lasch.) Fuck. Symb. myc. p. 157, in caulinis Rubi idæi aridis nascens, prope Mustiala mense Aprili semel nobis obviam venit.

Leptosphaeria Crepini (West.) De N. mensibus Augusto—Octobri hujus anni pluribus locis circa Mustiala occurrit. — Sporæ usque ad 26 mmi. longæ et 10 mmm. crassæ.

Chaetomium Fieberi Cord. in charta putrescente hoc anno copiose legimus.

Mustiala, m. Novembri 1874.

XI.

Agaricus (Entoloma) quispviliaris Karst. in Not. Sällsk. pro Faun. et Flor. Fenn. Förh. 9:de II., 1868, p. 329, ineunte mense Julio hujus anni (1875) prope lacum Salois in parœcia Tammela unico locoudo, umbroso et ster-

corato haud parce nobis obviam venit. — Species facillime et optime dictineta, *Ag. placenta* proxima. — Pileus leniter carnosus, convexo-expansus, vix umbonatus, lœvis vel leniter pruinatus, udus atrofulvus, marginem versus dilutior (fulvescens), siccus badiofulvescens vel badionigrescens, usque 4,5 cm. latus. Stipes sursum incrassatus demumque vulgo complanatus, basi curvatus, primo medulla alba farctus, dein cavus, badiofulvus, sursum pallidior, pruinosus seu furfurellus, circiter 4 cm. altus, 2—4 mm. crassus. Lamellæ emarginato-adnexæ, confertæ, ventricosæ vel postice latiores, incarnato-pallidæ. Sporæ ellipsoideæ, lœves, hyalinæ, longit. 9—10 mmm., crassit. 4—5 mmm. — Subcæspitosus. Odor debilis, haud gratus. Sapor fere nullus.

Agaricus (Galera) flexipes Karst. — Pileus campanulatus, obtusus, carnosulo-membranaceus, udus ferrugineus et pellucide striatulus, jove siccè ochreopallens, 1 em. vel paullo ultra latus. Stipes æqualis, flexuosus, e pallido ferruginascens, albo-fibrillosus, apice albo-pruinosus, 2—3 em. altus, 1,5 mm. circiter crassus. Lamellæ adnexæ, confertæ, oblongatæ, acie leniter crenulatæ, pallido-ferruginaentes. Sporæ ellipsoideæ, lœves, eguttulatae, flavescentes sen fuscidulæ, longit. 10—12 mmm., crassit. 5—6 mmm. — Inter ramenta lignea prope Mustiala die 20 mensis Maji hujus anni parcus lectus. — Gregarius. Ab affini *Ag. tenero* stipte flexoso, breviore, pileo obtusiori aliisque notis differens.

Chailletia Karst. Myc. fenn. I, pp. 21 et 241 in „Karstenia Fr. in litt.” mutanda est.

In Hedwigia 1875, N:o 2, p. 26, Dr **G. Winter** genus Pyrenomycetum novum „*Hypocreopsis*” dicavit, quum autem hocce nomen alio generi antea (vid. Karst. Myc. fenn. II, p. penultim.) a nobis est impositum, genus a Cl. Wintero conditum „*Selinia*” nominare nobis liceat.

Sphaerella tycopodina Karst. Fung. Fenn. exsicc. 569 (1866) eadem est ac *Sphaerella Niesslii* Auersw. in litt. Niessl, Beitr. zur Kenntn. der Pilz. p. 19 (1872) = *Gnomonia Niesslii* Auersw. in Rab. Fung. eur. 1154.

Pleospora comata Niessl. Beitr. zur Kenntn. der Pilz. p. 30 (1872) = *Sphaeria abscondita* Karst. Enum. Fung. Lapp. orient. p. 216 (1866) a *Pleospora herbarum polymorpha* specie haud est distinguenda. E descriptione hue quoque forte pertinet *Pleospora echinops* Hazsl. in Verh. der k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien. Band XXIII (1873) et in Hedw. 1874, N:o 9, p. 141.

Pleospora papillata Karst. Myc. fenn. II, p. 71, vix dubie identica est cum *Pleospora petiolorum* Fuck. Symb. Myc. p. 132.

Ex Nob. Rostafinskio in litt. *Anixia spadicea* Fuck. Symb. Myc. p. 91. Karst. Myc. fenn. II, p. 190, *Tubulina bicolor* Pers., *Didymium parietinum* Schrad., *Licea sulphurea* Wallr. et *L. pannorum* Wallr. unam eandemque speciem sistunt.

Ceratium hydnoides Alb. et Schw. in Fennia australi et media sat frequenter provenit.

Ceratium poroides Alb. et Schw. semel in regione Mustialensi reperimus.

Licea flexuosa Pers. Syn. Fung. p. 197 supra lignum pineum in Mustiala fine mensis Septembris 1866 est lecta.

Tubulina cylindrica (Bull.) De C. in ligno pineo prope Mustiala autumno sat raro obvenit.

Stemonitis splendens Rostaf. haud procul ab oppido Vasa die 2 mensis Augusti 1867, in ligno pineo putrido vigens, visa est.

Lamproderma columbinum (Pers.) in Fennia australi rarius nobis obviam venit, autumno.

Enteridium simillimum Rostaf. in Alno incana vetusta prope Iaecum Pähkijärvi in paroecia Tammela die 20 mensis Septembris 1867 invenimus. — Species rarissima. adhuc tantum in Fennia observata.

Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf. in Mustiala supra ligna abietina mense Septembri 1874 parcus legimus.

Badhamia utricularis (Bull.) Berk., **melleuca* Nyl.
in Fennia meridionali ad truncos Salicis capreæ prostratos
hieme et vere passim, v. c. Mustiala, Helsingfors, Åbo, Meri-
masku.

Physarum virescens Ditm. Supra Hypna viva in
regione Mustialensi mense Augusto exeunte 1866 rarissime
deprehensum.

Physarum leucophaeum Fr. in sacellania Meri-
masku mense Augusto 1860 supra muscos vivos viguit.

Fuligo varians Somm. cortice stipato supra Betu-
lam et Populum mensibus Augusto et Septembri in Fennia
australi haud raro provenit.

Fuligo varians p. *ecorticatum* Rostaf. in prato Mylly-
perä prope Mustiala die 3 mensis Septembris 1874 supra
folia et caules Vaccinii Vit. Idææ viva vel semiemortua sat
copiose obvenit.

Chondrioderma difforme (Pers.) Rostaf. supra
caules Trifolii et grama emortua nec non ad ramulos in
Fennia australi mensibus Augusto—Octobri viget.

Hemiareyria Karstenii Rostaf. in ligno acerino
in insula Runsala mense exeunte Septembri paucis specimi-
nibus a nobis lecta est.

Accidium Ranunculacearum De C. in sepulcreto
parœciæ Tammela in eunte æstate hujus anni in Aquilegia
vulgaris copiose crevit.

Mustiala, mensi Augusti 1875.

